

# Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 177 - 21205 BEAUNE Cédex

ABONNEMENT ANNUEL : 275 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. - CCP DIJON 3 500 28 0



80.26.35.45

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 17 - 24 juin 1993

## MAIS

**Pyrale : Généralisation du vol**  
**Pucerons : Situation saine**

### RESULTATS DES CAPTURES DE PYRALES

Stade : 9-10 feuilles à tout début de panache mâle visible dans le cornet.

## Pyrale

**SITUATION :** Le vol en cage d'élevage se poursuit doucement à Dannemarie sur Crête.

Au champ, suite aux premières captures citées la semaine passée, l'ensemble du réseau a enregistré des captures et notamment dès le 16 juin en Côte-d'Or.

Les premières pontes ont été observées dans le Mâconnais (le 18/06) et en zones basses de Franche-Comté (les 22 et 23/06).

**PRECONISATION :** Nous confirmons le caractère précoce du vol de pyrale. La pluviométrie actuelle perturbe quelque peu le vol mais l'hygrométrie qui en découle est très favorable au dépôt des pontes.

Les dates avancées dans le bulletin précédent restent valables : la meilleure période d'intervention se situera du 3 au 9 juillet. Pour le Mâconnais avancez le traitement de 2 à 3 jours, par contre en secteurs tardifs l'application pourra être décalée de quelques jours si les températures restent inférieures aux normales.

Nous vous rappelons que l'utilisation de pyréthrinoides liquides est susceptible d'induire des développements ultérieurs de pucerons : Surveillez ces parcelles jusqu'au brunissement des soies femelles.

Lieu	Période	du 12 au 18 juin	du 19 au 23 juin
21 Comblanchien		4	14
21 Vignolles		9	26
25 Sauvagny		4	2
25 Dannemarie/Crête		2	2
25 Bethoncourt		-	6
39 Annoire		5	2
39 Cosges		6	-
39 Santans		-	26
39 Thervay		-	3
39 Vaudrey		13	12
58 St Quentin/Nohain		10	10
70 Amance		20	10
70 Chenevrey		4	6
70 Cugney		16	2
70 Lavoncourt		4	6
70 Montseugny		6	4
70 Recologne les Rioz		1	0
71 Macon		3	0
71 Bragny/Saône		0	2
71 Pierre de Bresse		2	-
89 Auxerre		0	2
90 Bessoncourt		6	8

## Pucerons

Les vols de *Rhopalosiphum padi* et de *Sitobion avenae* sont actuellement soutenus à la tour d'Auxerre, cependant en culture la situation est globalement saine. Les pluies orageuses "lessivent" le feuillage. D'autre part le cortège des auxiliaires est maintenant bien installé et cela devrait suffire à contenir voire à anéantir les petites colonies de *Metopolophium dirhodum* ou de *Sitobion avenae* parfois présentes. Compte tenu des vols en cours la vigilance vis-à-vis du *Rhopalosiphum padi* reste de mise surtout dans le cas cité plus haut de "traitements liquides". Les dégâts occasionnés par ces pucerons sont décrits dans la fiche "Pucerons du maïs" jointe au bulletin n° 16.

733

## COLZA

**SITUATION :** Une montée d'*alternaria* est constatée en parcelles ; les orages font augmenter progressivement l'intensité de la maladie. Mais étant donné le faible inoculum de départ (voir bulletin précédent), la pression actuelle est somme toute relativement faible.

**PRECONISATION :** Tout traitement est inutile à moins de trois semaines de la récolte.

## POIS

**SITUATION :** Une montée d'*anthracnose* est constatée en parcelle suite aux séquences pluvieuses que nous venons de subir. Toutefois le retour d'un temps plus clément devrait minimiser la pression de la maladie.

**PRECONISATION :** Tout traitement est inutile à moins de trois semaines de la récolte.

★


★

★




# PYRALE DU MAÏS

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT - SERVICES DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX




Papillon mâle (entre 1,5 et 2 cm de long) se prend dans les pièges sexuels




Papillon femelle, apparaît de 2 à 8 jours plus tard


## PONTES



a - Ponte jeune (oöplaque) 0,5 à 1 cm de long




b - Ponte plus âgée



c - Stade tête noire précédant l'éclosion

## CHENILLES



Chenilles (2 à 3 cm de long) au milieu des sciures provenant de leur perforation

## DÉGÂTS



Perforation d'une tige occasionnant...



Souvent une casse de la panicule mâle



Parfois une casse de la tige



Chenille dans un épi

Mise à jour en janvier 1992

P 34

